



Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol  
FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE  
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5, IČ: 00064203

Identifikační štítek pacienta

## INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S VÝKONEM REKONSTRUKČNÍ VÝKON NA PŘEDONOŽÍ – ODSTRANĚNÍ HLAVIČEK ZÁNÁRTNÍCH KOSTÍ II. - V. PRSTU, NAPRAVENÍ DEVIACE 1. ZÁNÁRTNÍ KOSTI A PALCE A PODLE OPERAČNÍHO NÁLEZU I ZNEHYBNĚNÍ ZÁKLADNÍHO KLOUBU PALCE NA NOZE

### 1. *Diagnóza, která vede k provedení zdravotního výkonu (zdůvodnění/indikace):*

- Revmatická deviace předonoží.

### 2. *Informace o potřebném zdravotním výkonu (o jeho účelu, povaze, předpokládaném prospěchu a následcích):*

- Revmatická deviace předonoží, vyžaduje kombinaci operačních výkonů, kdy je nutné odstranit poškozené hlavičky zánártních kostí II. - V. prstu metatarzu a napravit špatné postavení palce.
- Po uspání (celková anestézie), či aplikaci svodné anestézie, při které je potlačeno vnímání bolesti na operované končetině, je na stehno naložena manžeta a jejím nafouknutím se výrazně sníží proudění krve v operované končetině. Tzv. „bezkrví“ zabezpečuje dobrou přehlednost operačního pole. Nejprve z řezu v plosce nohy jsou odstraněny otlaky pod hlavičkami metatarzů, hlavičky jsou uvolněny a postupně jsou odstraněny. Z dalšího řezu na vnitřní straně palce, podél první kosti zánártní, jsou odstraněny výrůstky kolem kloubu palce. Pak je uvolněn kloub mezi první zánártní kostí a kostí tarzu. Je odstraněna kloubní chrupavka a kosti jsou upraveny tak, aby bylo napraveno nefyziologické postavení první zánártní kosti. Kosti jsou fixovány kovovým materiálem – skobkami, šrouby nebo dlahou. Podle operačního nálezu u základního kloubu palce může být součástí operačního výkonu i znehybnění tohoto kloubu, aby byla vyrovnána nevhodná deviace palce. Palec je fixován šrouby, skobkami nebo dlahou. Operační rána je po jednotlivých vrstvách sešita.
- Jako nezbytný následek výkonu je operační rána a následně jizva.

### 3. *Rizika zdravotního výkonu:*

- Operační výkon vede k zásadnímu řešení zdravotních obtíží pacienta. Na základě zdravotního stavu a diagnózy je plně indikován. Přesto s sebou přináší rizika, kdy může výjimečně dojít i k zhoršení předoperačního zdravotního stavu pacienta.
- Operační výkon může být spojen zejména s těmito riziky: infekce močové a v oblasti operační rány, poruchy srážení krve spojené s nadměrnou krevní ztrátou nebo ucpáváním cév, poruchy centrálního nebo periferního nervového systému, poruchy funkce srdce, plic, mozku, jater, ledvin či ostatních orgánů, alergické reakce na použitý materiál a léky. Další komplikací může být otok nártu nohy, který může přetrvávat po operaci až 3 – 4 měsíce.
- Nepředvídatelné komplikace, které mohou nastat nebo se projevit během operace, si mohou vyžádat rozšíření operačního výkonu nebo jeho omezení v nezbytném rozsahu. Uvedené, i jiné zde nejmenované komplikace, mohou dočasně nebo trvale ovlivnit celkový zdravotní stav pacienta.

### 4. *Alternativy zdravotního výkonu:*

- Nejsou žádná alternativní operační řešení.
- Konzervativní postup (postup bez operace).
  - Výhody: pacient není zatížen operačním výkonem s jeho možnými riziky.
  - Nevýhody: přetrvává bolest, omezení hybnosti a deformace palce nohy, nutnost užívání léků, které tlumí bolest a zánět a mohou mít i nežádoucí vedlejší účinky.

### 5. *Údaje o možném omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po provedení příslušného zdravotního výkonu, lze-li takové omezení předpokládat; v případě možné nebo očekávané změny zdravotního stavu též údaje o změnách zdravotní způsobilosti:*

*Předpokládaná doba hospitalizace:* 3 – 5 dní

*Předpokládaná doba trvání pracovní neschopnosti (předpokládaná doba, po kterou pacient nebude schopen vykonávat své studium):* asi 2 – 3 měsíce, event. déle v závislosti na typu profese/studia.


**Předpokládaná omezení v běžném způsobu života a předpokládané změny zdravotní způsobilosti:** od druhého dne se začíná s rehabilitací, chůze o berlích bez zatěžování operované končetiny, nebo je povolena chůze ve speciální obuvi. Přibližně po dobu 5 týdnů je nutná chůze o berlích bez zatěžování operované končetiny.

**Další omezení v běžném způsobu života:** nelze plně specifikovat, záleží na individuálních pooperačních reakcích a zdravotním stavu pacienta.

**6. Údaje o léčebném režimu a preventivních opatřeních, která jsou vhodná, a údaje o poskytnutí dalších zdravotních služeb (zdravotních výkonů):**

- Nelze plně specifikovat, záleží na individuálním zdravotním stavu pacienta. Jinak viz propouštěcí zpráva - individuální doporučení.
- Preventivní opatření snižující riziko zánětu žil dolních končetin s krevní sraženinou jsou elastická bandáž dolních končetin po dobu minimálně 2 měsíců, dostatečný příjem tekutin a aplikace léků snižující riziko vzniku hluboké žilní trombózy a vhodný pohybový režim.
- Pacient bude po propuštění z nemocnice zván na kontroly určené operátorem.
- Přítomnost zánětu v jakékoli lokalizaci musí pacient konzultovat s praktickým lékařem a dle jeho zvážení i s ortopedem z naší kliniky.

**Prevence stranové záměny – označení strany a místa operace**



**Prohlášení lékaře:**

Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta/zákonného zástupce pacienta srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu informoval/a o jeho zdravotním stavu/o zdravotním stavu osoby jím zastupované a o veškerých shora uvedených skutečnostech, o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, včetně upozornění na možné komplikace. Pacient/zákonný zástupce pacienta byl seznámen s plánovaným způsobem anestézie (sedace), bude-li použita.

**Prohlášení lékaře, bude-li pacientovi implantován zdravotnický prostředek:**

Prohlašuji, že jsem poskytl/a pacientovi/zákonnému zástupci pacienta podrobnou informaci obsahující údaje, které umožňují identifikaci zdravotnického prostředku (včetně jeho příslušenství), který bude u pacienta implantován, spolu s pokyny týkajícími se bezpečnosti pacienta a jeho chování, včetně toho, kdy má pacient vyhledat lékaře a kterým vlivům prostředí by se neměl vystavovat vůbec nebo jen při dodržování vhodných preventivních opatření.

V Praze, dne.....20..... v.....hod. ....

**Podpis a jmenovka lékaře**

**Prohlášení a souhlas pacienta/zákonného zástupce pacienta:**

Já, níže podepsaný/á, prohlašuji, že jsem byl/a lékařem srozumitelně a v dostatečném rozsahu informován/a o svém zdravotním stavu/o zdravotním stavu osoby mnou zastupované a o veškerých shora uvedených skutečnostech. Údaje a poučení mi byly lékařem sděleny a vysvětleny, porozuměl/a jsem jim a měl/a jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly lékařem srozumitelně zodpovězeny.

Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením zdravotního výkonu/souhlasím s provedením výkonu u osoby mnou zastupované, případně s použitím uvedené anestezie (sedace), včetně provedení dalších zdravotních výkonů, pokud by jejich neprovedení bezprostředně ohrozilo můj život nebo zdraví/život nebo zdraví osoby mnou zastupované.

Současně také prohlašuji, že jsem lékaři sdělil/a všechny mně známé okolnosti, které by mohly zkomplikovat klidný průběh zdravotního výkonu (zejména užívané léky, alergie a všechna přidružená onemocnění).

Jsem si vědom/a, že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat.

**Pro zákonného zástupce pacienta:**

Jako zákonný zástupce nezletilého pacienta nebo pacienta s omezenou svéprávností prohlašuji, že veškeré shora uvedené informace byly poskytnuty rovněž tomuto pacientovi (za podmínky, je-li k tomu pacient přiměřeně rozumově a volně vyspělý). *Pokud pacientovi nebyly takové informace poskytnuty, uveďte se důvod jejich neposkytnutí:*

.....

V Praze, dne.....20.....

v.....hod.

.....

**Podpis pacienta\* /zákonného zástupce**

**Identifikace zákonného zástupce:**

Jméno a příjmení: .....

Datum narození: ..... Vztah k pacientovi: .....

**Podpisová doložka svědka:**

.....

Důvod nepodepsání, nemůže-li se pacient podepsat

.....

Způsob, jakým pacient projevil vůli

.....

Jméno a příjmení svědka

.....

Podpis svědka

\* Nezletilému pacientovi lze zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku. U pacienta s omezenou svéprávností se postupuje obdobně, nezohledňuje se však věk pacienta.